

EL DESTETE



La edad de destete de los cachorros varía según la raza de estos, un ejemplar de gato abisinio será mucho más maduro a la edad de 3 semanas que un ejemplar de gato persa. Cada raza tiene también sus características en cuanto alimentación, a un gatito persa le costará bastante empezar a comer pienso.

El destete adecuado empieza cuando el cachorro adquiere interés por oler cierta comida y eso suele suceder entre las 3 y las 5 semanas de edad.

Como proceder ante el destete.

En primer lugar es indispensable saber que el cachorro deberá seguir mamando durante un tiempo, la leche materna es el mejor alimento del que dispondrá en sus primeros meses de vida. Por tanto, aunque se inicie el destete y el gatito coma otros tipos de comida, debe dejarse aun con la madre hasta la edad mínima de 3 meses, incluso después de esa edad si el cachorro va a permanecer en casa no es aconsejable separarlo ya que este puede seguir mamando hasta la edad de 5 o 6 meses aunque esto no sea una condición indispensable. Normalmente las madres deciden cuando dar menos leche a sus gatitos.

El primer paso para destetar es acercar comida, preferiblemente húmeda y muy triturada, al cachorro. Para ellos existen comidas enlatadas específicas que les atraen por el olor y resultan fáciles de tragar, pero se puede proceder de igual modo con 'potitos' para niños de arroz con pollo o con ternera. Del mismo modo se puede elaborar una papilla en casa compuesta a base de pollo o ternera hervido y triturado. Si el gatito no come lo que se le ofrece, se puede insistir depositando un poco de comida en su lengua, si le gusta empezará a comer, de lo contrario no conviene forzarlo. Para esta primera toma de contacto conviene que el recipiente de la comida sea lo más plano posible, a menudo intentan morder el recipiente creyendo que es comida y si este es demasiado alto, se aburren de morder y no comen. Los primeros tres días, una vez haya empezado a comer, se le debe dar solo una toma, incrementando a dos y posteriormente a tres tomas diarias a medida que pasen los días. El número de tomas ideal es de tres tomas diarias hasta la edad de 6 meses, posteriormente se reducirán a dos comidas diarias.

Cuando el cachorrito coma de un modo normal, se deberá empezar a solidificar más la comida, para ello es bueno triturar el pienso con la papilla para que con ello se adapte también al sabor de este. Cuando el gato acuda a la llamada de la comida, será el momento ideal para presentarle el pienso, deberá tenerlo entonces a su disposición permanentemente para que pueda comerlo cuando desee.

No hay que confundir la toma de comidas con el pienso, las comidas como papillas, latas, pollo o ternera son las que se deben suministrar de una a tres veces por día.

El pienso debe estar siempre a disposición del animal y es importante que se acostumbre a él, para ello se puede mezclar con la comida húmeda. Una vez adaptado el cachorro irá comiendo pienso todo el día y cada vez menos cantidad de comida húmeda cuando le toque.